



Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles pour résoudre les problèmes d'infestations massives de rongeurs.

RATS & SOURIS

BRODITOP 17PB est un appât rodenticide en pâte conditionné en sachets individuels de 15 g pour le contrôle des souris domestiques, rats bruns et rats noirs, à tous les stades de développement. Sa formule est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique, qui permet le contrôle complet des populations résistantes connues de rongeurs. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie vis-à-vis de l'appât.

La formulation offre la combinaison de 5 propriétés spéciales :

- Un mélange de trois types de fermetures pour maximiser l'appétence de la pâte
- Un système de conservateurs qui maintient l'appât stable pendant la période d'application
- Une spéciale combinaison d'additifs qui assure que la texture de l'appât reste molle
- La formulation **PASTA PLUS** enrichie en céréales, particulièrement appréciée pour les espèces des rongeurs cibles
- La technologie **FLUO-NIP®** : un adjuvant spécial qui rend l'appât facilement identifiable même dans de mauvaises conditions d'éclairage et qui peut aussi détecter les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV. En faisant briller une lampe UV portable (lumière noire) sur les excréments de rongeurs, il est facile d'identifier et de suivre les mouvements des rongeurs.

Grâce à sa forte appétence, l'appât est extrêmement polyvalent : son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire, à l'intérieur des maisons privées ou autour des bâtiments.

BRODITOP 17PB contient un agent amersant (Benzocaïne de détonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

MESURES DE GESTION DE RISQUE

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés.

Étiqueter les postes d'appâtage selon les indications mentionnées dans la présente étiquette. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de suspicion d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les ossements de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments : Ne pas utiliser le produit près de plans d'eau ou cours d'eau (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des convulsions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. En cas de symptômes : appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : appeler un centre antipoison/un médecin. Informations au personnel de santé / au médecin : mixer les mesures de premiers secours si nécessaire, puis appeler un centre antipoison. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : • Ne pas déplacer ni cuisiner : contient un rodenticide ; BRODITOP 17PB, N° AMM : FR-2023-0018 ; substance active : Brodifacoum ; en cas d'incident, contacter un centre antipoison, N° ORFILA : 01 45 42 59 59.

Dangereux pour la faune.

En cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA : 01 45 42 59 59

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE :

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié. Ne pas se débarrasser du produit brodé dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Conserver à une température inférieure à 35 °C. Protéger de la lumière. Ne pas stocker à proximité des denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine et animale.

Durée de stockage : 3 ans à compter de sa date de fabrication.

AUTRES INFORMATIONS : en raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amersant et un colorant.

Nom homologué : **BRODITOP 17PB**
Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de pâte pour le contrôle des souris domestiques (à l'intérieur) et des rats – rat brun et rat noir (à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments)

USAGE NON PROFESSIONNEL (GRAND PUBLIC)

Contient 0,0017% m/m de Brodifacoum tach.

(N° CAS 56073-10-0)

N° AMM : FR-2023-0018

Détenteur de l'AMM/Fournisseur :

Zapi S.p.A. via Terza Strada 12
35026 Conselve (Pd) Italie.
Tél. +39 049 9597737
www.zapispa.com; info@zapispa.com

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

Distribué par : S.A.S. BRUNEL
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex
Retrouver plus d'informations sur le site
www.kpro-insecticides.com

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE - INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Catégorie d'utilisateurs : Non-professionnels (Grand public)

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

DOSE ET FREQUENCE D'APPLICATION :

Contre les souris domestiques (*Mus musculus*) - Utilisation à l'intérieur :

- 30-50 grammes d'appât par point d'appât tous les 2-5 mètres.
- Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments :

- 60-80 grammes d'appât par point d'appât tous les 5-10 mètres.
- Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments : placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés ; remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'élevage, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec des aliments. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

ED047

Fabriquée en Europe

150g e



APRAT



NE PAS DETACHER LE SACHET INTERNE DE LA BOITE

N° de lot / Date de fabrication : voir emballage