


Attention au report d'impression

Attention au report d'impression



**BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE**

**STAR JARDIN**

**STAR JARDIN**

**BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE**

La bouillie bordelaise Star Jardin est un fongicide particulièrement efficace contre la plupart des maladies rencontrées sur les arbres fruitiers, arbustes d'ornement et légumes.

**MODE ET DOSES D'EMPLOI**  
Usages et doses autorisées en traitement des parties aériennes.  
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées.

CULTURES	CIBLES/USAGES	DOSE MAXIMUM D'EMPLOI (L/10 m <sup>2</sup> )	DÉLAI AVANT RÉCOLTE
Fruits à coque : Amandier, Noyer, Châtaignier, Noisetier, Pistachier**	Bactériose	12,5 g/L	5 jours
	Tavelure	12,5 g/L	
Fruits à pépins : Pommier, Poirier, Cognassier, Néflier, Nashi, Pommette	Bactériose	6,25 g/L	5 jours
	Cloque	25 g/L	
Pêcher, Abricotier, Nectarinier	Bactériose	6,25 g/L	5 jours
	Cloque	25 g/L	
Pomme de terre	Mildiou	25 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 2,5 g/m <sup>2</sup>	21 jours
	Bactériose	20 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 2 g/m <sup>2</sup>	
Tomate, Aubergine	Mildiou	6,25 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 0,625 g/m <sup>2</sup>	21 jours
	Bactériose	20 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 2 g/m <sup>2</sup>	
Vigne	Bactériose	7,5 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 0,75 g/m <sup>2</sup> ***	21 jours
	Mildiou	7,5 g/L pour 10m <sup>2</sup> soit 0,75 g/m <sup>2</sup> ***	

\*\* Les applications sur pistachier doivent être réalisées au plus tard au stade BBCH 79 (la graine remplit la coquille, la croissance est terminée).  
\*\*\* 5 applications maximum par an contre le mildiou de la vigne.

**PRÉCONISATIONS D'EMPLOI**  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION. RÉEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT.  
Préparation et application de la bouillie : verser la quantité requise de bouillie à l'aide de la dosette fournie, dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie d'eau. Compléter avec le volume d'eau nécessaire à l'application et agiter. Traiter jusqu'à la limite du ruissellement. Peut être appliqué à tout moment de la journée. Traiter uniquement par temps calme, sans vent et sans risque de pluie. Ne traiter que les cultures saines et non endommagées, prendre soin des cultures voisines. Attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y rentrer. Arrêter le traitement selon le délai indiqué dans le tableau. Ne préparer que la quantité nécessaire de bouillie. Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits, etc., en particulier si le terrain est en pente. Contient un sachet zip, à refermer après utilisation.

La Bouillie Bordelaise est un fongicide minéral qui a une action de contact et qui doit être utilisé de façon préventive. Le traitement est possible toute l'année en fonction de la maladie. Le nombre de traitements et leur cadence sont liés au développement de la végétation et aux précipitations. **Premiers secours** : En cas d'urgence, appelez le 15 ou le 112 ou contactez le centre antipoison le plus proche. Tél. 01 45 42 59 59. **Conséils généraux** : S'éloigner de la zone dangereuse. En cas d'exposition ou de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **Inhalation** : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de trouble respiratoire, contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison. **Contact avec la peau** : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau ou se doucher. En cas d'irritation ou éruption cutanée, consulter un spécialiste. **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un filet d'eau paupières ouvertes. Consulter un spécialiste. **Ingestion** : Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Ne PAS faire vomir sans avis médical. Contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison. Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise, consulter un médecin et lui présenter l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité. **Intoxication animale** : Contacter votre vétérinaire. **Stockage** : Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, ventilé et à l'abri de la lumière, à l'écart de tout aliment et boisson y compris ceux pour les animaux. Conserver hors de la portée des enfants.

**STAR JARDIN**

**BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE**

**STAR JARDIN**

**BOUILLIE BORDELAISE NON COLORÉE**

**Ne tache pas**

**500 g**

**UAB\***  
\*utilisable en agriculture biologique selon le règlement en vigueur.

XXXXXXXXXX

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H332** Nocif par inhalation. **H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P261** Éviter de respirer les poussières et brouillards de pulvérisation. **P270** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P391** – Recueillir le produit répandu. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. **EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. **SP1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau le fonds de bidon/ le produit non utilisé et les eaux de lavage du pulvérisateur. Attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y rentrer. **N° UFI : 9DWU-25N6-y99K -HDHR**

**ATTENTION**

Ne pas utiliser le bec verseur. Pour utiliser, ouvrir l'étui par le haut puis le sachet à l'intérieur et utiliser la dosette. Refermer le sachet après emploi. Ne pas retirer le sachet de l'étui (conserver les propriétés du produit et les indications d'utilisation.)

**COMPOSITION**  
Sulfate de cuivre équivalent à 200 g/kg de cuivre métal (20% m/m), N° CAS : 8011-63-0.  
Nom homologué : Bouillie Bordelaise Manica NC JARDIN, N° AMM n°2189994. Emploi autorisé dans les jardins. Détenteur de l'AMM : MANICA S.p.A. - Via all'Adige 4 - 38068 ROVERETO (TRENTO) - ITALIE - www.manica.com - Type de produit : fongicide utilisable sur vigne, arbres fruitiers et cultures légumières. Mode d'action : produit de contact, action multisite (le produit détruit les champignons par différentes voies d'actions : stoppe le développement des champignons et limite l'apparition de souches résistantes), groupe M01 fongicide. Formulation : Poudre mouillable (WP).

FR  
ETUI SI PROPRE ET SANS PRODUIT  
SACHET  
A DÉPOSER A L'INTÉRIEUR

Distribué par STAR  
3 Pacages d'Argenson, 37800 NOUÂTRE  
Tél. 02 47 65 30 71 - contact@star-proficid.com

Masse nette : 500 g  
Réf. BB500  
EMB 37374A  
N° de lot/  
date de fabrication  
voir emballage

3 760059 702344

N° de Lot imprimeur + N° de pose

Coté impression

 Zone d'activité Ouest park 134 rue d'Italie 72300 Louvailles Tél: 02.43.92.82.82	Désignation: ETUIB BB500 ETUI BOUILLIE BORDELAISE 500G Référence produit : 702344			
	Dimensions (en mm): 135.00x60.00x195.00	Black Cyan Magenta Yellow decoupe		
Type de Carton:	Poses: 6	Présence BAT machine souhaitée :	Bon pour accord	Code barre lisible :
ONDULE	Type Impression: OFFSET	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Date: Signature:	<input checked="" type="checkbox"/>
Version graphique: STA05-0301-17091-V02-RECTQ_BAT	Logiciel: ArtPro+ 23.03	Date: 03/02/2025	Dorure <input type="checkbox"/>	Braille <input type="checkbox"/>
			Pelliculage <input type="checkbox"/>	Vernis : VERNIS ACRYLIQUE BRILLANT